

睪丸發炎

睪丸發炎通常是由細菌和病毒引起，如不及時進行治療，則可能誘發前列腺炎、內分泌疾病、腎炎等腎臟疾病、泌尿感染疾病、嚴重者可導致喪失性功能，甚至喪失生育能力。

三大嚴重危害

(1) 可致性功能喪失：睪丸炎可導致男性性功能下降，甚至完全喪失性功能，給夫妻生活帶來困難。

(2) 誘發“危險”疾病：睪丸炎易誘發各種嚴重疾病，如精索靜脈曲張、靜索炎、前列腺炎，內分泌疾病、腎炎等腎臟疾病、泌尿感染疾病、惡性腫瘤等，嚴重威脅男人生命。

(3) 喪失生育能力：睪丸炎還可導致死精，無精，喪失生育能力，並且將炎性病菌傳染給配偶，造成婦科疾病，給妻子健康帶來巨大傷害。

分類和症狀

急性睪丸炎：多見于中青年和兒童。多因泌尿系統感染和前列腺精囊炎等並發及前列腺切除而引起的。主要症狀是：發病急、多高熱、寒顫、患側陰囊疼痛、皮膚緊脹、紅腫、脹大、尿急、尿頻、壓痛明顯，可並發鞘膜積液。

慢性睪丸炎：多由急性睪丸炎遷延而成或一開始即為慢性表現。一般無全身症狀，睪丸漸漸腫大，並形成硬結。有輕的疼痛或不痛，陰囊不紅不熱，常經數月以致1~2年後，才形成膿腫，潰後流出稀膿，有時可形成癩管，纏綿難愈。