

尖形濕疣(菜花)

俗稱菜花，取其形狀像花菜而得名，它是一種病毒感染，主要是接觸到有“人類乳頭病毒”的性伴侶而罹患的，近年有增多的趨勢，菜花常見於性生活頻繁的年輕人，它的潛伏期可以從幾個禮拜到幾個月不等，有人甚至可以幾年都不發病。

診斷：典型的病灶在男性而言，是在包皮、冠狀溝、陰莖、龜頭或尿道口上長些粉紅色或淺白色的疣狀物，可以單個或多個，也可以一顆顆的，也有些會聚合在一起，女性患者出現的部位以大小陰唇，陰道口居多，但也可能波及到肛門周圍及會陰部份，無論男女菜花多會伴隨搔癢，灼熱的感覺，尖形濕疣不像梅毒，疱疹，可以以抽血檢驗方式而得以輔助診斷，它完全是要靠泌尿科或婦產科醫師對於病灶的特徵，病人的病史有充分的了解，才能獲得正確的診斷。

治療：尖形濕疣的治療，一般可用點藥，電氣燒灼或手術切除方式來處理，如何選擇處理的方式端視菜花的部位、大小、多寡及醫師的喜好而定，尿道內的菜花則必須以內視鏡直視下做燒灼來治療，最近幾年由於鐳射在醫學上的應用，也可以用鐳射光來作燒灼，其他如使用干擾素也有學者建議使用，但除了價格貴外還有些副作用，臨床上很少作為第一線治療藥，雖然菜花是種良性疾病，但是過去有許多研究証實它與男性的陰莖癌及女性子宮頸癌有密切關係，我們實在不能小看它。